

Test

◇ E+M1-07/08-02 ◇

- Wichtig:**
- ♡ Bitte nur die **Vorderseite** eines Blattes beschreiben.
 - ♣ Resultate sind gut sichtbar zu unterstreichen.
 - ♠ Nur gut leserliche, sauber gegliederte Lösungen mit sofort auffindbaren Resultaten können korrigiert werden. (Ersichtlicher Lösungsweg!)
 - ◇ Die einzelnen Aufgaben sind durch einen Strich zu trennen.
 - ♡ **Alle Teilaufgaben geben gleich viele Punkte.**
 - ♣ Dokumentechtes Schreibzeug!

Diverses aus Vektoralgebra, Geometrie, Matrizen- und Determinantenrechnung

Probl. 1 Gegeben ist ein Kreis k_1 mit dem Mittelpunkt $M(5, 4)$ und dem Radius $r = 2$. Dazu sei $P_0(1, 1)$ ein Punkt, den wir als Pol bezeichnen.

- (a) Berechne die Polare p zu P_0 sowie deren Schnittpunkte mit k_1 . Skizziere alsdann die Situation.
- (b) Berechne die Tangenten von P_0 aus an k_1 und dazu die Tangentenschnittpunkte mit k_1 . Trage die erhaltenen Punkte in die Skizze ein.
- (c) Berechne eine Gleichung für die Gerade $g_1 = \overline{P_0M}$. Berechne damit die Schnittpunkte $g_1 \cap k_1$. Trage die erhaltenen Punkte in die Skizze ein.
- (d) Berechne einen Punkt P_1 , so dass k_1 der Apolloniuskreis zu $\overline{P_0P_1}$ ist. Trage den erhaltenen Punkt in die Skizze ein. Was fällt an diesem Punkt besonders auf?
- (e) Gegeben ist ein zweiter Kreis mit dem Mittelpunkt P_0 und dem Radius $2r$. Suche zu k_1 und k_2 die Potenzgerade und skizziere die Situation.
- (f) Bestimme den Schnittpunkt der Potenzgeraden mit der Geraden durch die beiden Kreismittelpunkte.

Probl. 2 Gegeben sind: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- (a) Berechne B^{-1} .
- (b) Berechne $A = B \cdot D \cdot B^{-1}$.
- (c) Berechne $A \cdot A$ und $A \cdot A \cdot \dots \cdot A = A^{10}$.
- (d) Berechne $\det(A)$ und $\det(D)$. Was stellt man fest?
- (e) Berechne $A \cdot \vec{a}$ und $A \cdot \vec{b}$.
- (f) Berechne $A \cdot (\lambda \vec{a} + \mu \vec{b})$.
- (g) Der Ursprung spannt mit \vec{a} und \vec{b} ein Parallelogramm auf. Berechne den Inhalt F_1 dieser Figur.
- (h) Berechne den Inhalt $F_2(\lambda, \mu)$ der Figur, die durch den Ursprung und $\lambda \vec{a}$ sowie $\mu \vec{b}$ gegeben ist.
- (i) Berechne $\frac{F_2(\lambda, \mu)}{F_1}$

Probl. 3 Gegeben ist ein Dreieck mit den Eckpunkten A , B und C :

$$A = A(0, 0), \quad B = B(10, 0), \quad C = C(3, 8).$$

- (a) Berechne den Höhenschnittpunkt H .
- (b) Berechne den Schnittpunkt der Schwerlinien S .
- (c) Berechne den Umkreismittelpunkt U .
- (d) Wie steht es mit der linearen Abhängigkeit der Vektoren \vec{US} und \vec{UH} ?
- (e) Berechne das Verhältnis $\frac{|\vec{UH}|}{|\vec{US}|}$.
- (f) Sei $\vec{a} = \vec{UA}$, $\vec{b} = \vec{UB}$, $\vec{c} = \vec{UC}$. Berechne $\vec{h} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ und $\vec{s} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.
Fällt dabei etwas auf?
- (g) Bekanntlich schneidet eine Schwerlinie durch einen Eckpunkt die dem Eckpunkt gegenüber liegende Seite genau in der Seitenmitte. Diesen Schnittpunkt nennen wir Seitenmittelpunkt S_a , S_b oder S_c . Berechne den Umkreismittelpunkt U_S des Dreiecks $\triangle(S_a S_b S_c)$ und auch den Radius r_S dieses Dreiecks.
- (h) Eine von einem Eckpunkt aus gezogene Höhe schneidet die gegenüberliegende Seite hingegen im Höhenfusspunkt H_a , H_b oder H_c . Berechne den Umkreismittelpunkt U_H des Dreiecks $\triangle(H_a H_b H_c)$ und auch den Radius r_H dieses Dreiecks. Fällt dabei etwas auf?
- (i) Untersuche, wie es steht mit der linearen Abhängigkeit der Vektoren \vec{UH} und $\vec{UU_H}$.
- (j) Berechne das Verhältnis $\frac{|\vec{UH}|}{|\vec{UU_H}|}$.

Probl. 4 Gegeben ist ein Dreieck im Raum mit den Eckpunkten A , B und C , das als Grundfläche G eines Körpers dient. Es gilt: $A = A(0, 0, 1)$, $B = B(10, 0, 1)$, $C = C(3, 8, 3)$. Weiter ist ein Punkt $D = D(1, 2, 8)$ gegeben. Die Figur $ABCD$ bildet somit ein Tetraeder.

- (a) Berechne den Volumeninhalt, den Grundflächeninhalt und daraus die Länge der Höhe h_D von D aus auf die Grundfläche G .
- (b) Berechne den Höhenfusspunkt H_D von h_D in der Grundfläche G .
- (c) Nun wird D so verschoben, dass die Länge der Höhe nicht ändert, der neue Höhenfusspunkt jedoch mit C zusammenfällt. Berechne die Koordinaten von D .

Viel Glück!