


# Test in Analysis — Teil 1 $\diamond$ Version dt. $\diamond$ Type I1 Bi $\diamond$ 1 a

CodeM1W T1I1AC0405-1.tex Name, Datum, Klasse .....

Die Lösungen sind anzukreuzen, einzukreisen oder zu benennen. Richtige Kreuze oder Kreise u.s.w. geben je einen Pluspunkt. Falsche Kreuze oder Kreise geben je einen Minuspunkt.


## Probl. 1



Das obenstehende Bild zeigt eine Funktion in  $[-7, 7]$ . Bestimme, welches Bild für die folgenden Funktionen in Frage kommt, falls der Ausdruck überhaupt zu einem Bild passt. Markiere einen Strich, wenn nichts passt:

Funktion	$\frac{-x^4}{3-x^4}$	$\frac{x^3}{3+x^4-\sin(x)}$	$\frac{-x^4 \cdot e^x}{3+x^4+ \tan(x) }$	$\frac{x^3}{3+x^3-\sin(x)}$
Bild Nummer				

## Probl. 2



Gegeben ist:

$$f(x) = \frac{x}{3+x^4-\tan(x)}$$

Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

- (a)  $f$  hat unendlich viele Pole.
- (b)  $f$  hat unendlich viele Nullstellen.
- (c)  $f$  hat endlich viele Nullstellen.
- (d)  $f$  ist streng monoton fallend für  $x > 3$ .
- (e)  $f$  ist positiv für  $x > 3$ .
- (f) Wir berechnen z.B.  $\lfloor f(600) \rfloor = 0$ ,  $\lfloor f(600 + \pi) \rfloor = 0$ ,  $\lfloor f(600 + 2\pi) \rfloor = 0 \dots$   
Wir behaupten jetzt:  $\lfloor f(x) \rfloor$  ist periodisch für  $x > 600$ .
- (g)  $f(x^2)$  ist gerade.

Richtige Lösung deutlich markieren:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

**Probl. 3** Betrachte den *Mathematica*-Code:

```
f[x_, n_] := Ceiling[2Sin[n Pi/2 x]]^2 - x;
g[x_, n_] := Floor[2Sin[n Pi/2 x]]^2 - x;
t = Table[f[x, n] - g[x, n], {n, 1, 100}] /. x -> 0.5;
Table[t[[k]] - t[[k + 8]], {k, 20, 27}]
```

Welcher Output ist der richtige, (falls der richtige Output in der Liste vorhanden ist)?

- (a) {1, -3, 0, -3, -1, 3, 0, 3}
- (b) {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27}
- (c) {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
- (d) {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}
- (e) Anderer Output!

**Richtige Lösung deutlich markieren:**

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

**Probl. 4** Sei  $g(x) = x - 2$ ,  $h(x) = x^2 - 2$ . Damit bilden wir:

$f_1 = g \circ h$	$f_2 = h \circ g$	$f_3 = h \circ (g \circ g)$	$f_4(x) = g \circ (h \circ h)$	$f_5 = h \circ (g \circ h)$	$f_6 = g \circ (h \circ g)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Ordne, falls möglich, die Nummern der Ausdrücke folgenden Funktionstermen zu (Zahl notieren, falls nicht möglich Kreuz)! **Lösung deutlich markieren:**

Term	$14 - 8x^2 + x^4$	$-4x^2 + x^4$	$2 - 4x + x^2$	$-4x + x^2$	$14 - 8x + x^2$
Nummer					

**Probl. 5**  $f_1(x) = (-2 + x^2)(-1 + x^2)$ ,  $f_2(x) = (f_1(x))^{\frac{1}{2}}$ ,  $f_3(x) = (f_2(x))^4$

- (a)  $f_1$  hat im Intervall  $[0, 2]$  folgende Anzahl Nullstellen: (**Lösung deutlich markieren**)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Andere Anzahl
---------------------	---------------

- (b)  $f_2$  resp.  $f_3$  ist im Intervall  $[0, 2]$  zwischen folgenden Nullstellen nicht definiert:

$f_2$ : Nullstellen (Intervall(e)) eintragen:	$f_3$ : Nullstellen (Intervall(e)) eintragen:

**Probl. 6** Polarkoordinaten:  $r(x) = \cos(2x) - \sin(5x)$ ,  $x \in [0, 2\pi] \rightsquigarrow$  Plot? (4 Punkte)  
(Weiter: Dazu Projektaufgabe „Blumen und Früchte“ nach mündlicher Mitteilung bis Ende Januar.)

Viel Glück!

WIR1