


Test in Analysis — Teil 1 \diamond Version dt. \diamond Type I1 Bi \diamond 1 b

CodeH1S T111AC0405-1a.tex

Name, Datum, Klasse

Die Lösungen sind anzukreuzen, einzukreisen oder zu benennen. Richtige Kreuze oder Kreise u.s.w. geben je einen Pluspunkt. Falsche Kreuze oder Kreise geben je einen Minuspunkt.


Probl. 1



Das obenstehende Bild zeigt eine Funktion in $[-7, 7]$. Bestimme, welches Bild für die folgenden Funktionen in Frage kommt, falls der Ausdruck überhaupt zu einem Bild passt. Markiere einen Strich, wenn nichts passt:

Funktion	$\frac{x^4}{-x^4 + 3}$	$\frac{x^3}{3 + x^4 - \sin(x)}$	$\frac{-x^4 \cdot e^x}{3 + x^4 + \tan(x) }$	$\frac{x^3}{3 + x^3 - \sin(x)}$
Bild Nummer				

Probl. 2



Gegeben ist:

$$f(x) = \frac{-x}{+ \tan(x) - 3 - x^4}$$

Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

- (a) f hat unendlich viele Pole.
- (b) f hat unendlich viele Nullstellen.
- (c) f hat endlich viele Nullstellen.
- (d) f ist streng monoton fallend für $x > 3$.
- (e) f ist positiv für $x > 3$.
- (f) Wir berechnen z.B. $\lfloor f(600) \rfloor = 0$, $\lfloor f(600 + \pi) \rfloor = 0$, $\lfloor f(600 + 2\pi) \rfloor = 0 \dots$
Wir behaupten jetzt: $\lfloor f(x) \rfloor$ ist periodisch für $x > 600$.
- (g) $f(x^2)$ ist gerade.

Richtige Lösung deutlich markieren:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

Probl. 3 Betrachte den *Mathematica*-Code:

```
f[x_, n_] := Ceiling[2Sin[n Pi/2 x]]^2 - x;
g[x_, n_] := Floor[2Sin[n Pi/2 x]]^2 - x;
t = Table[f[x, n] - g[x, n], {n, 1, 100}] /. x -> 0.5;
Table[t[[k]] - t[[k + 8]], {k, 20, 27}]
```

Welcher Output ist der richtige, (falls der richtige Output in der Liste vorhanden ist)?

- (a) {1, -3, 0, -3, -1, 3, 0, 3}
- (b) {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27}
- (c) {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
- (d) {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}
- (e) Anderer Output!

Richtige Lösung deutlich markieren:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Probl. 4 Sei $g(x) = -2 + x$, $h(x) = -2 + x^2$. Damit bilden wir:

$f_1 = g \circ h$	$f_2 = h \circ g$	$f_3 = h \circ (g \circ g)$	$f_4(x) = g \circ (h \circ h)$	$f_5 = h \circ (g \circ h)$	$f_6 = g \circ (h \circ g)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Ordne, falls möglich, die Nummern der Ausdrücke folgenden Funktionstermen zu (Zahl notieren, falls nicht möglich Kreuz)! **Lösung deutlich markieren:**

Term	$14 - 8x^2 + x^4$	$-4x^2 + x^4$	$2 - 4x + x^2$	$-4x + x^2$	$14 - 8x + x^2$
Nummer					

Probl. 5 $f_1(x) = (-2 + x^2)(-1 + x^2)$, $f_2(x) = (f_1(x))^{\frac{1}{2}}$, $f_3(x) = (f_2(x))^4$

- (a) f_1 hat im Intervall $[0, 2]$ folgende Anzahl Nullstellen: (**Lösung deutlich markieren**)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Andere Anzahl
---------------------	---------------

- (b) f_2 resp. f_3 ist im Intervall $[0, 2]$ zwischen folgenden Nullstellen nicht definiert:

f_2 : Nullstellen (Intervall(e)) eintragen:	f_3 : Nullstellen (Intervall(e)) eintragen:

Probl. 6 Polarkoordinaten: $r(x) = \cos(2x) - \sin(5x)$, $x \in [0, 2\pi] \rightsquigarrow$ Plot? (4 Punkte)
(Weiter: Dazu Projektaufgabe „Blumen und Früchte“ nach mündlicher Mitteilung bis Ende Januar.)

Viel Glück!

WIR1